

表一：不同治療組合的具體療程

治療組合（病人人數）	
tremelimumab 及 durvalumab 加化療組（338 人）	患者服用免疫治療藥物 tremelimumab 75 毫克及 durvalumab 1,500 毫克，同時接受化療，共進行四次療程，每次相隔 21 天。其後每四星期服用一次 durvalumab，如病情出現惡化便停藥；以及服用多一次 tremelimumab。
durvalumab 加化療組（338 人）	患者服用免疫治療藥物 durvalumab 1,500 毫克及接受化療，共進行四次療程，每次相隔 21 天。其後每四星期服用一次 durvalumab，如病情出現惡化便停藥。
化療組（337 人）	患者接受最多六次化療，每次相隔 21 天。

表二：不同治療組合的無惡化存活期（中位數）及 12 個月無惡化存活率

治療組合（病人人數）	無惡化存活期（中位數）	12 個月無惡化存活率
tremelimumab 及 durvalumab 加化療組（338 人）	6.2 個月	26.6%
durvalumab 加化療組（338 人）	5.5 個月	24.4%
化療組（337 人）	4.8 個月	13.1%

表三：不同治療組合的整體存活期（中位數）及 24 個月整體存活率

治療組合（病人人數）	整體存活期（中位數）	24 個月整體存活率
tremelimumab 及 durvalumab 加化療組（338 人）	14 個月	32.9%
durvalumab 加化療組（338 人）	13.3 個月	29.6%
化療組（337 人）	11.7 個月	22.1%